



2




1




3

AKO HODNOTIŤ


KAROL HENSEL



4



6



5

Takmer polovica našich druhov rýb, presnejšie povedané 47 %, patrí do čeľade kaprovitých. Kaprovité ryby sú nielen na druhy najbohatšou čeľadou, ale sú aj našimi najrozšírenejšími a najhojnejšimi sa vyskytujúcimi rybami. Asi tretina našich kaprovitých ryb má z rybárskeho hľadiska neatraktívne rozmery, alebo sa vyskytuje vzácne. Predmetom lovу je 22 druhov, z nich päť počítame medzi hospodársky preferované. Je preto pochopiteľné, že s trofejami kaprovitých ryb sa budeme stretávať veľmi často.

Zhotovenie trofeje kaprovitej ryby by nám nemalo robiť veľké ťažkosti. Rozhodne nie je tak náročné ako u lososovitých rýb. Kaprovité ryby majú lebku dobre skostnatú. Aj ich lebka sa skladá z väčšieho počtu kostí, ktoré sa pri neodbornom zaobchádzaní (napríklad pri prevareni) fahko navzájom oddelia. Na bizarné tvary takto oddelených kostí je sice zaujmavý pohľad, ale za trofej sa považovať nemôžu.

Okrem mozgovej časti lebky a zubných kostí spodnej čeľuste sú u kaprovitých rýb súčasťou trofeje aj spodné pažerákové kosti. Ležia pod zadným okrajom bázy mozgovej časti lebky, na konci žiabrového koša. Sú to vlastne rozšírené kosti žiabrového koša. Na

TROFEJE KAPROVITÝCH RÝB

Obr. 1. MOZGOVÁ ČASŤ LEBKY (NEUROKRÁNIUM) KAPRA (BO — základná záhlavná kost, EL — bočná čuchová kost, EOC — bočná záhlavná kost, EPO — horná ušná kost, F — čelová kost, ME — stredná čuchová kost, OS — očnicovoklinová kost, PA — temenná kost, PTO — krídlovoušná kost, PTS — krídlovoklinová kost, PS — priklínová kost, PV — predradlicná kost, PRO — predná ušná kost, SO — horná záhlavná kost, SPH — klinovoušná kost)

Šípka ukazuje na lôžko základnej záhlavnej kosti, zbavenej rohovinového povlaku.

Obr. 2. KOSTRA ŽIABROVÉHO KOŠA KAPRA PRI POHLADE ZHORA.

ĽAVÉ NADŽIABROVÉ KOSTI ODSTRÁNENÉ.

(BH — základná jazylková kost, C — chrupkovitá tyčinka, CB — bočná žiabrová kost, CH — bočná jazylková kost, CU — základná žiabrová kost, EB — nadžiabrová kost, EH — nadjazylková kost, IH — medzijazylková kost, HB — podžiabrová kost, HH — podjazylková kost, OP — pažeráková kost, PB — hiltanová žiabrová kost, UH — zadná jazylková kost)

Obr. 3. PAŽERÁKOVÉ KOSTI A ZUBY PÓDUSTVY.

(A) — červenice (B) a mreny (C). Hore — pohľad zozadu, dole — pohľad šíkmo zhora.

Obr. 4. KOSTRA HLAVY KAPRA (OZNAČENÉ SÚ LEN KOSTI TVÁROVEJ ČASTI LEBKY).

(A — klobová kost, D — zubná kost, DS — piata očnicová kost, EC — vonkajšia krídlovitá kost, EN — vnútorná krídlovitá kost, IO — stredná viečková kost, H — jazylkovočeľustná kost, L — prvá očnicová kost, M — horočeľustná kost, MP — zadná krídlovitá kost, O — viečková kost, P — podnebná kost, PM — predná horočeľustná kost, PO — predná viečková kost, Q — štvorcová kost, R — uhlává kost, RB — lúče žiabrovej blany, RO — rypáková kost, SM — podčeľustná kost, SOR — nadočnicová kost, UH — zadná jazylková kost)

Obr. 5. KOSTRA TRUPU, CHVOSTA A KONČATÍN KAPRA.

(I — prvý stavec, III — tretí stavec, IV — štvrtý stavec, BA — bazálne, C — kľúčna kost, CO — krkavčia kost, HY — podchvostová kost, IH —, IS — základné kosti nepárných plutiev, P — panvová kost, PC — zadná kľúčna kost, PL — rebrá, PT — zadná spánková kost, SC — nadkľúčna kost, SCA — lopatka, VC — chvostové stavce, U — výbežok posledného stavca, Z — posledný stavec)

Obr. 6 SCHÉMA MERANIA DĺŽKY TELA KAPROVITEJ RYBY.

pažerákových kostiach sú prirastené tzv. pažerákové zuby. Pažerákové kosti a zuby sú u kaprovitých rýb druhovo špecifické. Kostí mávajú rôzny tvar a šírku, a zuby sú ešte variabilnejšie. Kapor ich má napríklad nízke a ploché, podľa zasa stlačené, nožovité. Boleň má konce zubov zahnute, červenica vrúbkované. U mreny stoja pažerákové zuby v troch radoch, u jalca v dvoch, ale napríklad u plotice len v jednom rade. Zdanivo bezzubé kaprovité ryby teda môžu potravu hrýzti pomocou pažerákových zubov. Pažerákové kosti sú totiž párovité, a sú zubami otočené šíkmo dozadu a nahor. Zuby takto stoja presne oproti rozšírenému lôžku základnej záhlavnej kosti mozgovej časti lebky. Toto lôžko je potiahnuté tvrdým rohovitým povlakom a nazýva sa žarnov. O tento žarnov drvia pažerákové zuby potravu.

Pri preparácii pažerákových kostí a zubov musíme byť opatrní. Zuby sú sice prirastené k pažerákovým kostiam, ale nie až tak pevne, aby zniesli nešetrné zaobchádzanie. Nezľaknite sa však, keď zbadáte pri pažerákových kostiach „vylámané“ zuby ešte skôr, ako ste sa kosti dotkli. V bezprostrednej blízkosti prirastených zubov stoja totiž voľné, náhradné zuby. Nám sa ale jedná o zuby prirastené k pažerákovým kostiam.

Kosti kaprovitých rýb sú dostatočne pevné a pri sušení sa nekrúta tak veľmi ako napríklad kosti lososovitých rýb. Preto sú, najmä u kapra, vhodné na montáž celého skeletu.

O správnom spôsobe merania sme hovorili už pri lososovitých rybách. Podobné zásady platia aj pre kaprovité ryby. Podobným spôsobom budeme postupovať aj pri vyváraní lebiek a príprave trofeje vôbec. Upozorňujeme ale, že základná záhlavná kost je u niektorých druhov kaprovitých ryb predĺžená a siaha ďaleko dozadu. Preto nemôžeme hlavu takýchto rýb oddeľovať od trupu tesne za zátylkom. Rez musíme viesť až za polovicu dozadu vystretych prsných plutiev. Ostatne, o správnom vedení rezu sa môžeme presvedčiť pri pohľade do telesnej dutiny vypitanej ryby. Uvidíme tamjasne spodnú stranu stavcov a aj výbežok základnej záhlavnej kosti.

A nakoniec dobrá rada. Venujme pozornosť nielen hospodársky preferovaným, ale všetkým lovňom druhom kaprovitých rýb. Trofej môže byť veľmi cenná a pritom nemusí byť veľká!

Foto: F. Zadunajský

